



Blefaroplastia



Generalidades

Es un procedimiento quirúrgico, el cual está destinado a remover el exceso de piel y manejar las bolsas grasas que se forman tanto en los párpados superiores como en los inferiores, de tal manera que se llega a mejorar el aspecto de los ojos cansados haciéndolos ver más frescos y jóvenes.

Dicho procedimiento puede llevarse a cabo junto con otros de rejuvenecimiento facial como el lifting (estiramiento total de la cara).



Tipo de anestesia:

Puede ser local cuando se trata de los párpados superiores o de los inferiores; puede ser multimodal cuando se trata de ambos párpados: inferiores y superiores.

Tiempo quirúrgico:

Aproximadamente de 30 minutos a 1 hora y 15 minutos según sea el caso.

Recuperación:

Aproximadamente de 4 a 6 horas.

Complicaciones

En la blefaroplastia superior se realiza una incisión a nivel del pliegue palpebral, se retira el exceso de piel y las hernias grasosas: interna, media y externa, posteriormente se realiza una sutura intradérmica y se colocan en los extremos externos del párpado algunos pequeños puntos separados. En la blefaroplastia inferior se realiza el mismo procedimiento con la diferencia de que la incisión se realiza a nivel del borde de las pestañas. Ambas incisiones alrededor de los 6 a 12 meses serán casi imperceptibles.



Pueden presentarse complicaciones como

- Sangrado
- Hematomas
- Infección
- Lagrimeo constante
- Asimetría en los párpados
- Alteración en la apertura y cierre de los párpados

"EVITE EL CIGARRILLO MÍNIMO 1 SEMANA ANTES Y UN MES DESPUÉS DE LA CIRUGÍA"

USTED PUEDE REDUCIR LOS RIESGOS QUIRÚRGICOS HACIENDO CASO Estricto DE LAS RECOMENDACIONES QUE LE INDICA LA CLÍNICA GÓMEZ ARBELÁEZ.

Recomendaciones postquirúrgicas

Colocar hielo en forma intermitente durante las primeras 36 horas postquirúrgicas envolviéndolo siempre en una toalla para evitar quemaduras.

- Si nota inflamación exagerada de los párpados comuníquese inmediatamente con la clínica.
- Tome los medicamentos como se le indicó en la fórmula médica.
- No tome más de un medicamento a la misma hora, y hágalo preferiblemente después de las comidas.
- No retire las cintas de sus párpados, si se ensucian puede cambiarlas.
- Aplique agua thermal sobre las heridas varias veces al día.
- No hacer esfuerzo ni agacharse durante las primeras 24 horas postquirúrgicas.
- No exponerse al sol durante los primeros 2 meses postquirúrgicos.
- Utilice protector solar varias veces al día para evitar manchas por los morados.
- No sumergirse en tinas ni en piscinas durante las 2 primeras semanas postquirúrgicas.
- Lavar las manos antes de las curaciones.
- Para mejorar su recuperación se recomienda tomar de 5 a 10 sesiones de Indiba, las cuales puede realizar en nuestra clínica



La seguridad de sentirse y verse bien

Manejo y Seguimiento



El primer control será al tercer día postquirúrgico, con la enfermera jefe.

El segundo control será al octavo día postquirúrgico con el Doctor Jorge Mario Gómez en el cual se retiran las suturas.

El doctor Jorge Mario Gómez define en el segundo control la frecuencia de las siguientes citas.

En caso de presentarse alguna duda o inconveniente favor comunicarse a los siguientes teléfonos.

Dr. Jorge Mario Gómez
Cel: 315 547 23 47

Clínica Gómez Arbeláez Armenia
Tel: 746 63 03 / Cel: 316 523 61 96

TENDRÉ EN CUENTA LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES QUE ME DIÓ LA CLÍNICA GÓMEZ ARBELÁEZ RESPECTO A MI INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA

RECUERDE LLAMAR ANTE CUALQUIER DUDA

SI NO ENCUENTRA UNO DE LOS MÉDICOS O ALGUIEN DE LA CLÍNICA Y TIENE UNA EMERGENCIA, ASISTA A UN SERVICIO DE URGENCIAS.



La seguridad de sentirse y verse bien

Calle 1A Norte 12-36 Consultorio
202

Tel: (606) 7466303
3165236196

www.clinicagomezarbelaez.com



Clínica Gómez Arbeláez