

# Cantopexia



## Generalidades

Es un procedimiento destinado para elevar la comisura externa de los párpados para hacer que los ojos demasiado redondos adquieran un contorno más almendrado. También se utiliza la cirugía de párpados para tensar el párpado inferior cuando este es demasiado laxo. Elimine esa expresión de tristeza en sus ojos e ilumine su mirada.

### DURACION DEL PROCEDIMIENTO:

De 40 minutos a una (1) hora

### RECUPERACIÓN:

Aproximadamente de 4 a 6 horas



## COMPLICACIONES

### SANGRADOS

El sangrado o hemorragia es la pérdida de sangre. Puede ocurrir dentro o fuera del cuerpo. Es posible que se presente como reacción a un corte, una herida o como consecuencia de una lesión a un órgano interno. Intraoperatoria se puede presentar un corte de un vaso sanguíneo sin cauterizar. Existen muchas situaciones en las que usted puede sangrar. Por ejemplo, un moretón o hematoma es un sangrado debajo de la piel, en posquirúrgico puede presentar sangrados de aspecto normal por medio de drenajes.

### HEMATOMA

Consiste en la acumulación excesiva de sangre debajo de la piel. Acompañado de síntomas como Intenso dolor, Coloración violácea de la piel y aumento del tamaño en algún lugar del cuerpo.



¡La seguridad de sentirse y verse bien!



## INFECCIÓN

Las manifestaciones de infección de herida operatoria aparecen generalmente entre el tercero y décimo días del postoperatorio, aunque con menos frecuencia pueden aparecer antes o después. El tejido celular subcutáneo es el más frecuentemente comprometido. La manifestación más frecuente es la fiebre, puede haber aumento de dolor en la herida, así como edema y eritema.

Se denomina infecciones quirúrgicas a todas aquellas que se originan por gérmenes bacterianos y/o por los hongos como consecuencia de un acto quirúrgico, presentándose la patología infecciosa en el periodo inmediato o mediato a la intervención

## DEHISCENCIA DE SUTURA

Abertura espontánea de las capas de la piel que se habían cerrado con sutura durante una intervención quirúrgica. Puede asociarse a una infección de herida, puntos de sutura rotos, inflamación, entre otros.

## Recomendaciones Postquirúrgicas

1. Aplique Agua Thermal sobre las heridas varias veces al día por tres días.
2. Realizar limpieza en las mañanas con gasa húmeda de agua de thermal, solución salina o agua estéril.
3. Aplique en sus párpados inferiores si fueron operados después de los 8 días Yeux contorno de ojos en las noches.
4. No hacer esfuerzo de agacharse durante las primeras 24 horas.
5. No exponerse al sol durante los dos primeros meses.
6. Utilice protector solar varias veces al día para evitar manchas por los hematomas (morados) residuales por pigmentación en este sitio.
7. No sumergirse en tinas, ni piscinas las cuatro primeras semanas.
8. Los puntos se retiran en la clínica, a los diez (10) días en su control con el especialista.
9. Para acelerar su proceso normal de recuperación es recomendable tomar sesiones de Cámara Hiperbárica, la clínica ofrece un paquete de 5 sesiones.
10. Lavar las manos antes de realizar la curación.

## Seguimiento

Se dan recomendaciones explicadas por la auxiliar de enfermería y/o enfermera jefa y se entregan en un documento escrito dentro del cual están consignados los números telefónicos en caso de requerir asistencia por parte de los médicos especialistas o las enfermeras jefes.

Posteriormente deben asistir a un control al 3 día con la Enfermera Jefe para seguir la evolución.

El segundo control es a los 10 días con el Especialista para el retiro de puntos.

Se debe tener un seguimiento a su evolución en los controles siguientes son según criterio médico.



*Dra. Jorge Mario Gómez*

Calle 1A Norte 12-36 Consultorio  
202

Tel: (606) 7466303  
3165236196

[www.clinicagomezarbelaez.com](http://www.clinicagomezarbelaez.com)



Clinica Gómez Arbeláez