


Fisura de Labio y Fisura de paladar



Generalidades

Es un procedimiento quirúrgico y se recomienda que sea a edad temprana, de para pacientes de fisura de labio a partir de los tres meses y para pacientes de fisura de paladar entre los 9 y 12 meses. Estas operaciones se realizarán dependiendo del peso, la salud general del niño y la severidad de la hendidura. Además, dependiendo de la severidad puede realizarse por etapas o en una sola intervención.

Posteriormente, cuando el niño tiene más edad se puede practicar cirugía estética para corregir algunos defectos del labio, la nariz, las encías y/o el paladar.



Tipo de anestesia:

Sedativa, multimodal, es decir se combinan diferentes tipos de medicamentos para obtener un mejor resultado.

Tiempo quirúrgico:

Tiene una duración aproximada de 1 a 2 horas para cada cirugía.

Recuperación:

Aproximadamente de 4 a 6 horas.

Complicaciones

Los niños con labio leporino/paladar hendido suelen padecer de más infecciones de oído, debidas al desarrollo incompleto del paladar y de los músculos palatinos, que son necesarios para abrir las trompas de Eustaquio, las cuales se encuentran a cada lado de la garganta y conducen al oído medio. Los niños con paladar hendido deben estar bajo supervisión constante de un especialista en garganta, nariz y oído (otorrinolaringólogo), para evitar daños permanentes al oído debido a infecciones crónicas.

Habla y Lenguaje:

La pérdida de la audición puede ocasionar problemas de aprendizaje en cuanto al desarrollo del habla. El niño con paladar hendido debe examinarse a temprana edad para practicarle cirugía reconstructiva. La voz de estos bebés tiene un acento nasal pero después de la cirugía puede someterse a una terapia para el desarrollo del lenguaje.

Odontología:

Es necesario que los niños con labio leporino y/o paladar hendido reciban tratamiento odontológico lo más pronto posible para asegurarse que las mandíbulas del niño son de la forma y tamaño correcto, corregir la posición de cada diente, y mantener una buena higiene dental.

Las complicaciones postquirúrgicas de este procedimiento son:

- Sangrado abundante.
- Dehiscencia de sutura.
- Infección.

USTED PUEDE REDUCIR LOS RIESGOS QUIRÚRGICOS HACIENDO CASO ESTRICTO DE LAS RECOMENDACIONES QUE LE INDICA LA CLÍNICA GÓMEZ ARBELÁEZ.



CLÍNICA
Gómez Arbeláez
Desde 1998

La seguridad de sentirse y verse bien

Recomendaciones Postquirúrgicas

No dar entretenedor.

No dar leche de 8 a 15 días.

Dar alimentación de acuerdo a la edad con cuchara, jeringa o gotero por 15 días.

Administrar líquidos claros durante las primeras 48 horas.

Colocar al paciente en posición semisentado.

Administrar los alimentos por el lado contrario a la cirugía.

Inmovilizar los brazos para evitar que el paciente toque y lastime el área quirúrgica.

Antes y después de hacer los cuidados del paciente la persona responsable debe lavarse las manos con agua y jabón.

Es muy importante asistir a la cita de control, en caso de no poder cumplirla avisar con 24 horas de anticipación.

Manejo y Seguimiento



El primer control sera al tercer dia postquirurgico, con la enfermera jefe

El segundo control sera al decimo dia postquirurgico con el doctor Jorge Mario Gomez para retirar extremos de sutura. En esta cita se determinaran controles posteriores segun evolucion

En caso de presentarse alguna duda o inconveniente por favor comunicarse a los siguientes telefonos.

Dr. Jorge Mario Gómez
Cel: 315 547 23 47

Clínica Gómez Arbeláez Armenia
Tel: 746 63 03 / Cel: 316 523 61 96

TENDRÉ EN CUENTA LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES QUE ME DIÓ LA CLÍNICA GÓMEZ ARBELÁEZ RESPECTO A MI INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA.

RECUERDE LLAMAR ANTE CUALQUIER DUDA

SI NO ENCUENTRA UNO DE LOS MÉDICOS O ALGUIEN DE LA CLÍNICA Y TIENE UNA EMERGENCIA, ASISTA A UN SERVICIO DE URGENCIAS.



La seguridad de sentirse y verse bien

Calle 1A Norte 12-36 Consultorio
202

Tel: (606) 7466303
3165236196

www.clinicagomezarbelaez.com



Clínica Gómez Arbeláez



La seguridad de sentirse y verse bien