

Cirugía Plástica Vaginal o Labioplastia



¡La seguridad de sentirse y verse bien!

Generalidades

También conocida como rejuvenecimiento vaginal, es el procedimiento destinado a devolverles a los músculos vaginales la tonicidad perdida por partos o por el envejecimiento, o el procedimiento destinado a reconstruir o a cambiar el aspecto de la vagina ya bien sea por razones estéticas o no. El término vaginoplastia se usa para definir cualquier operación vaginal de este tipo.

Esta cirugía se realiza en pacientes con las siguientes alteraciones:

1. Ensanchamiento del Canal Vaginal

La vagina es un tubo músculo membranoso que se extiende del cuello uterino hasta el vestíbulo de la vagina (hendidura entre los labios menores). Hay cuatro músculos que comprimen la vagina y actúan como esfínteres, dando el marco alrededor de la vagina. Estos músculos pueden verse afectados en su tonicidad debido a varias causas que pueden provocar una alteración del diámetro del canal vaginal. No hay una edad donde esto suceda, por lo que el rango de mujeres que se ven afectadas por esto es amplio. Hay pacientes muy jóvenes aún sin partos, que por un factor constitucional no estaban conformes con el diámetro de su vagina.

2. Partos Vaginales

Los partos vaginales con o sin episiotomía, es la causa más frecuente de un aumento en el diámetro del canal vaginal. El diámetro promedio de la vagina es de 4.5 cm y la cabeza de un bebé es de aproximadamente 12cm, por lo que este estiramiento puede producir una alteración en las fibras musculares vaginales alterando su elasticidad.

3. Raza

Generalmente las mujeres de raza blanca tienen menos tonicidad a nivel del canal vaginal, lo que las hace más propensas a tener trastornos en el canal vaginal.

4. Estado Hormonal

A medida que las mujeres van creciendo van disminuyendo la presencia de estrógenos, lo que hace que las fibras del canal vaginal pierdan su elasticidad, lo que resulta en un aumento en el diámetro.

5. Factor Congénitos

Así como en otras partes del cuerpo humano, existen variaciones en tamaño y forma, esto también sucede a nivel genital.

TIPO DE ANESTESIA

Sedativa, multimodal

DURACION DEL PROCEDIMIENTO:

De 40 minutos a una (1) hora.

RECUPERACIÓN:

Aproximadamente de 4 a 6 horas.



Complicaciones

SANGRADOS: El sangrado o hemorragia es la pérdida de sangre. Puede ocurrir dentro o fuera del cuerpo. Es posible que se presente como reacción a un corte, una herida o como consecuencia de una lesión a un órgano interno. Intraoperatoria se puede presentar un corte de un vaso sanguíneo sin cauterizar Existen muchas situaciones en las que usted puede sangrar. Por ejemplo, un moretón o hematoma es un sangrado debajo de la piel, en posquirúrgico puede presentar sangrados de aspecto normal por medio de drenajes.

HEMATOMA: Consiste en la acumulación excesiva de sangre debajo de la piel.

INFECCION: Las manifestaciones de infección de herida operatoria aparecen generalmente entre el tercero y décimo días del postoperatorio, aunque con menos frecuencia pueden aparecer antes o después. El tejido celular subcutáneo es el más frecuentemente comprometido. La manifestación más frecuente es la fiebre, puede haber aumento de dolor en la herida, así como edema y eritema.

Se denomina infecciones quirúrgicas a todas aquellas que se originan por gérmenes bacterianos y/o por los hongos como consecuencia de un acto quirúrgico, presentándose la patología infecciosa en el periodo inmediato o mediato a la intervención.

DEHISCENCIA DE SUTURA: Abertura espontánea de las capas de la piel que se habían cerrado con sutura durante una intervención quirúrgica.



Recomendaciones postquirúrgicas

1. Realizar limpieza diaria con gasa húmeda con solución salina o agua estéril.
2. Mantener área bien seca.
3. Después de ingresar al baño realizar limpieza nuevamente.
4. Aplicar fitoplus dos veces al día.
5. Si Presenta enrojecimiento en la piel y aumento de la temperatura favor informar a la clínica, puede ser signo de infección.
6. Aplicar hielo durante los primeros 3 días para evitar inflamación, siempre protegiéndose con gasa o toalla para evitar quemaduras.
7. Tome los medicamentos como se le indicó, procure no tomar más de un medicamento a la misma hora para evitar gastritis.
8. No exponga las cicatrices al sol durante seis (6) meses.
9. No sumergirse en tinas ni en piscinas las primeras cuatro semanas.
10. Para acelerar su proceso normal de recuperación es recomendable tomar sesiones de Cámara Hiperbárica, la clínica ofrece un paquete de 5 sesiones.
11. Si tiene rutina de gimnasia, iníciela en forma gradual después de los 15 días del post-operatorio.
12. Para mejorar su recuperación se recomienda tomar de 5 a 10 sesiones de Indiba, las cuales puede realizar en nuestra clínica

Manejo y seguimiento

Posteriormente deben asistir a un control al 3 día con la Enfermera Jefe para seguir la evolución.

El segundo control es a los 10 días con el Especialista para el retiro de puntos.

Se debe tener un seguimiento a su evolución en los controles siguientes son según criterio médico.

Si tiene alguna pregunta o necesita algún tipo de información favor llamar.



Dra. Jorge Mario Gómez

Calle 1A Norte 12-36 Consultorio
202

Tel: (606) 7466303

3165236196

www.clinicagomezarbelaez.com



Clinica Gómez Arbeláez